

Yatlorf

Trappola a feromoni per la cattura di elateridi



CARATTERISTICHE ED ISTRUZIONI:

YATLORF è una trappola efficace per il monitoraggio degli elateridi (*Agriotes brevis*, *A. sordidus*, *A. litigiosus*, *A. ustulatus*). Le trappole, a seconda della stagione e dell'insetto da monitorare, vanno innescate con uno o più feromoni specifici. La trappola è fornita di appositi alloggiamenti per i feromoni.

Ad inizio stagione (terza settimana di marzo), si posiziona la trappola innescata con feromone di *A. brevis*, che va collocato al di sotto delle alette del corpo trappola.

Circa al 10-15 di aprile, si svuota la trappola dagli insetti catturati e si posiziona il feromone per *A. sordidus* nell'apposito alloggiamento posto nella parte bassa delle alette traslucide.

Dopo un mese, si procede a svuotare e pulire la trappola e sostituire il feromone per *A. sordidus*, sempre nell'apposito alloggiamento posto nella parte bassa delle alette traslucide; contemporaneamente si posiziona il feromone per *A. litigiosus* nell'alloggiamento posto in alto nelle alette traslucide. Al 10 di giugno, si svuota la trappola dagli insetti, si sostituisce il feromone per *A. litigiosus*, che in questo caso va messo nella parte bassa della trappola (in sostituzione del feromone di *A. brevis*). Nell'alloggiamento in alto va posto il feromone per *A. ustulatus*. Al 10 luglio, va svuotata la trappola e sostituito il feromone di *A. ustulatus*, che va sempre posizionato nell'alloggiamento in alto.

Al 10 di agosto si svuotano per l'ultima volta le trappole, che andranno recuperate per l'anno successivo.

Le trappole vanno posizionate in numero di almeno 3 fino a 10 ettari di terreno e successivamente 3 trappole ogni 10 ettari. Vanno posizionate in linea o ai vertici di un triangolo di circa 50 m di lato.

La trappola va posizionata in modo stabile sul terreno, facendo in modo che il bordo inferiore resti coperto da 1-2 cm di terreno. Posizionare una pallina indicatrice per ritrovare la trappola quando la coltura cresce.

Ogni confezione contiene: corpo trappola completo, 2 feromoni per *A. sordidus* e 2 feromoni per *A. litigiosus*. Disponibili feromoni per *A. brevis* e *A. ustulatus*.