

siltop[®] evo

Concime CE - Miscela fluida di microelementi Zinco (Zn) Molibdeno (Mo)

Bio



CARATTERISTICHE

SILTOP[®] EVO è un fertilizzante a base di microelementi contenente, oltre che Zinco e Molibdeno, Acido mono silicico (MOSA) stabilizzato e quindi biodisponibile per la pianta. La tecnologia innovativa utilizzata per rendere il silicio biodisponibile consente alla coltivazione di assumere elevate dosi di questo elemento che, pur essendo largamente presente nei suoli, viene assorbito dalla pianta in quantità minime e con difficoltà. L'assunzione di Silicio, insieme ad un complesso di microelementi indispensabili per il metabolismo della pianta, si traduce in numerosi effetti positivi che possiamo suddividere in due categorie:

- Ruolo passivo: rafforzamento della parete cellulare con accumulo di silicio; creazione di una barriera meccanica a livello della parete cellulare
- Ruolo attivo: stabilisce un corretto equilibrio tra i nutrienti, controllando fenomeni di antagonismo e correggendo squilibri nutrizionali; potenzia le difese naturali della pianta, amplificando le risposte di difesa.

Vantaggi principali:

- Migliora la resa delle colture
- Aumenta la qualità delle produzioni
- Migliora la risposta di autodifesa della pianta
- Riduce i fenomeni di stress della pianta
- Migliora la serbevolezza e la conservazione dei raccolti.

CAMPI DI APPLICAZIONE

SILTOP[®] EVO può essere utilizzato sia per via fogliare che radicale, pur essendo più efficace il trattamento fogliare.

SILTOP[®] EVO penetra attraverso gli stomi, attraversa il floema, distribuendosi nella pianta fino alle radici.

SILTOP[®] EVO favorisce la diffusione degli ioni nutrienti in tutta la pianta e catalizza i processi metabolici; una parte trasloca fino alle radici ed una parte maggiore viene assorbita dalla parte epigea, interagendo efficacemente con la parete cellulare.

AVVERTENZE

Seguire attentamente le indicazioni per l'uso riportate in etichetta. Per strategie di impiego contattare il servizio tecnico SERBIOS.

DOSI

SILTOP[®] EVO va impiegato a partire dalle prime fasi vegetative, impiegando i dosaggi indicati in modo continuativo durante i cicli delle colture. Impieghi sporadici, anche a dosi elevate, danno risultati inferiori. In caso risulti fondamentale il miglioramento della shelf-life in post-raccolta, si consiglia di aumentare la dose/ha nell'ultimo trattamento (2-5 giorni prima della raccolta) o negli ultimi due trattamenti.

Fruttiferi (Pomacee, Drupacee, Kiwi, Vite): 4/8 trattamenti a 250-300 ml/ha, il primo in prefioritura, il secondo ad allegagione avvenuta, poi cadenzando i trattamenti ogni 10-15 giorni. Aumentare a 350 ml/ha l'ultimo trattamento, in prossimità della raccolta. Cucurbitacee/Solanacee: 4/8 trattamenti a seconda del ciclo, 250-300 ml/ha, il primo in prefioritura e poi cadenzando i trattamenti ogni 8-15 giorni. Aumentare a 350 ml/ha l'ultimo trattamento, in prossimità delle raccolte.

Ortaggi a foglia (incluso IV gamma/ babyleaf), 4/8 trattamenti a seconda del ciclo, 250-300 ml/ha, il primo a 2[^]-3[^] foglia, poi cadenzando i trattamenti ogni 8-10 giorni. Aumentare a 350-400 ml/ha l'ultimo trattamento, in prossimità delle raccolte. Patata: 4/5 trattamenti a 250-300 ml/ha; il primo in prefioritura e successivamente ogni 10-15 giorni. Aumentare a 350 ml/ha l'ultimo trattamento, in prossimità della raccolta (con apparato fogliare integro).

Altre colture: a seconda del ciclo, da 4 a 8 trattamenti a 250-300 ml/ha, a partire da prefioritura/comparsa prime foglie e cadenzando i trattamenti ogni 8-15 giorni. Aumentare a 350 ml/ha l'ultimo trattamento, in prossimità della raccolta.

Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente tutte le istruzioni riportate sull'etichetta della confezione

COMPOSIZIONE

Zinco (Zn) solubile in acqua 1,8 %
Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0.2 %

CLASSE TOSS.

Pericolo



CONFEZIONI

Flacone da 500 ml (= 570 g)
Cartoni da 12 pz