

super Carpo

Trappola per il monitoraggio di carpocapsa pomonella

Sono disponibili feromoni plus (carica 5 mg) e cairomone, particolarmente indicati per il monitoraggio di colture sottoposte a confusione sessuale.

COME SI USA

SUPER CARPO si distingue per la particolare forma della capannina, studiata appositamente per il monitoraggio di *Cydia pomonella*. La trappola è una classica "delta" con le aperture più ristrette, in modo da favorire un flusso più definito di feromone, che consente una cattura più efficace e precisa dell'insetto. Il posizionamento e le istruzioni per l'uso sono analoghe a quelle di SUPER TRACK ALA.

COME SI INSTALLA


- Aprire la capannina seguendo le tracce presenti.
- Inserire la tavoletta con il feromone posizionato al centro e richiudere le bande laterali.
- Appendere all'interno della vegetazione con l'ausilio del laccio in plastica.

Bio



CONFEZIONI

Cartoni da 34 pz



super Cocid

Trappola per il monitoraggio delle cocciniglie

COME SI USA

SUPER COCID è una trappola che viene impiegata con successo per la cattura ed il monitoraggio delle cocciniglie. La trappola, a forma di tetto, sfrutta la caratteristica delle cocciniglie di avere un andamento del volo di tipo ascendente. Viene utilizzata con il feromone specifico e si è dimostrata estremamente efficace per la cattura di *Aonidiella aurantii*, *Planococcus citri*, *Pseudaulacaspis pentagona*, *Comstockaspis perniciosus* e altre cocciniglie.

COME SI INSTALLA

Le trappole vanno posizionate con l'ausilio di un laccio in plastica e, per ottenere la migliore efficacia, devono risultare parallele al suolo. Normalmente si utilizzano 3-4 trappole per ettaro.

Bio



CONFEZIONI

Cartoni da 34 pz

