

Dacus Track/Plus

Trappola per la cattura di *Dacus oleae*

COME SI USA

DACUS TRACK e DACUS TRACK PLUS sono trappole a pannello cromotropico giallo collato ed innescate con il feromone per la cattura di *Dacus oleae*. Le trappole sono ideali per il monitoraggio e per la cattura di un elevato numero di individui, al fine di ridurre le popolazioni dell'insetto. Il potere attrattivo è dato dalla combinazione tra il pannello giallo ed il feromone sessuale.

DACUS TRACK e DACUS TRACK PLUS vanno poste sulla pianta sul lato sud/sud ovest, se possibile ove esista un ampio spazio davanti alla trappola. Per il monitoraggio si usano 4 trappole/ettaro, distribuite all'interno dell'uliveto, distanti almeno 30-35 metri tra loro ed almeno 10-15 metri dai bordi. Non montare le trappole sui bordi, in quanto si determinerebbe la cattura di insetti degli appezzamenti vicini. In caso si volesse una cattura "spinta", posizionare 15-20 trappole/ettaro in modo uniforme, rispettando le distanze dai bordi. Il pannello cromotropico abbinato all'attrattivo specifico può essere impiegato anche per la cattura di *Ceratitis Capitata* o *Rhagoletis cerasi*.

COME SI INSTALLA

Inserire il fil di ferro all'interno delle scanalature più esterne del pannello e collocare la fialetta del feromone sopra il pannello con il ferretto in dotazione. A seconda della zona e dell'andamento stagionale, la trappola va posizionata dall'inizio di giugno in poi.

La differenza tra DACUS TRACK e DACUS TRACK PLUS consiste nella durata del feromone specifico: il feromone di DACUS TRACK è efficace per 5-6 settimane, mentre quello di DACUS TRACK PLUS è efficace per 8-9 settimane. Nella confezione di DACUS TRACK PLUS sono inclusi 4 pannelli cromotropici, per poterli sostituire durante il periodo di cattura, mantenendo lo stesso feromone.

Diabrotica Track

Trappola per la cattura di *Diabrotica virgifera*

COME SI USA

Per facilitare il monitoraggio delle aree colpite ed a rischio di infezione, vengono impiegate con successo trappole per la cattura dell'insetto, che possono essere impiegate, a seconda dei casi, con o senza il feromone sessuale specifico. L'impiego delle trappole permette di prevedere l'intensità dell'attacco nell'anno successivo e l'eventuale diffusione nelle aziende limitrofe, non ancora colpite.

COME SI INSTALLA


Le trappole, di colore giallo e nel formato 20x24,5 cm, vanno posizionate entro il 15 di giugno ad un'altezza di circa 1 metro da terra, inizialmente con l'ausilio di un tutore e successivamente legando la trappola al di sopra del punto di inserzione della spiga. Le trappole vanno posizionate internamente, ad una decina di metri dal bordo dell'appezzamento e ad una distanza di almeno 30-40 metri l'una dall'altra. È preferibile installare le trappole sul lato lungo dell'appezzamento e da entrambe le parti. In caso di forti infestazioni, sarà sufficiente 1 trappola per lato dell'appezzamento. Nel caso invece di basse infezioni o di monitoraggio di nuove possibili infezioni, è consigliabile aumentare questo numero a 2-3 trappole per lato. Le trappole vanno controllate almeno una volta la settimana (sarebbe preferibile almeno 2) e durante il controllo si procederà alla conta degli adulti catturati, alla pulizia della trappola ed all'eventuale sostituzione del pannello collato che abbia perso adesività. La capsula di feromone va invece sostituita ogni 45 giorni.

Bio




CONFEZIONI

Cartoni da 34 pz



Bio



CONFEZIONI

Cartoni da 34 pz

